

伝染病について

園内における伝染病の蔓延を防ぐため、又、感染した園児が十分に病気から回復する為に、以下の疾患に罹患した場合、登園停止措置をとらせていただきます。下記の伝染病と診断された場合は、園内の感染状況把握や二次感染防止対策の為、当園まで早めにご一報ください。

なお、治癒後登園される際には必ず「登園に関する意見書」を担任まで御提出下さい。**意見書がない場合は感染症が十分回復していないと判断し、登園をお断りさせていただきますので、**ご理解、御協力お願いいたします。

● 主な伝染病の種類と出席停止期間の基準 (意見書が必要とされるもの)

病名	出席停止期間、症状、感染経路など
インフルエンザ	発症後 5 日を経過し、かつ解熱した後 3 日を経過するまで <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、その他風邪症状 感染経路…飛沫感染（くしゃみ、咳などで感染する）
百日咳	特有の咳が消失するまで <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…発作性の咳を長期反復持続 感染経路…飛沫感染
麻疹	解熱した後 3 日を経過するまで <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…発疹、発熱、咳、鼻水、目やに、口腔内に白い斑点 感染経路…空気、飛沫感染
風疹 (三日ばしか)	発疹が消失するまで（発疹後の色素沈着は登園可） <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹、結膜の充実 感染経路…空気、飛沫感染
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳下腺の腫脹が消失後 1～2 日 <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…37～38 度の発熱、耳下腺、舌下腺の腫脹 感染経路…飛沫感染
水痘 (水ぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…水疱のある発疹、発熱 感染経路…空気、飛沫感染、接触感染
咽頭結膜熱 (プール熱)	主要症状が消退した後 2 日を経過するまで ただし、発病後 2 週間はプール入水禁止になります <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…発熱、喉の痛み、結膜炎、首のリンパ節の腫れ 感染経路…飛沫、接触感染
結核	排菌がなく、症状により医師が伝染のおそれがないと認めるまで <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…初期；自覚症状なし。X 線にての発見が多い 感染経路…飛沫感染
流行性角結膜炎	医師によって伝染のおそれがないと認められるまで <ul style="list-style-type: none"> 主な症状…発熱、眼瞼浮腫、目やに 感染経路…接触感染

急性出血性結膜炎	<p>医師によって伝染のおそれがないと認められるまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…結膜充血、眼瞼浮腫、浸出液 ・ 感染経路…接触感染
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157 O-26 など)	<p>医師によって伝染のおそれがないと認められるまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…腹痛、嘔吐、水様性あるいは泥状の下痢便、血便 ・ 感染経路…経口感染
溶連菌感染症	<p>抗生剤治療開始後 24 時間を経て、全身状態が改善するまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…全身に広がる小さな発赤、いちご舌、発熱 ・ 感染経路…飛沫感染
マイコプラズマ感染症	<p>急性症状（発熱、嘔吐、下痢等）の消失、全身状態が改善するまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…発熱、頭痛、嘔吐、下痢、咳 ・ 感染経路…飛沫感染
感染性胃腸炎 (ロタウイルス・ノロウイルスなど)	<p>嘔吐、下痢消失し、全身状態が改善するまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…下痢、嘔吐、発熱 ・ 感染経路…経口感染
急性細気管支炎 (主に RS ウイルス)	<p>急性症状（発熱、咳等）の消失、全身状態が改善するまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…発熱、咳 ・ 感染経路…飛沫感染

●条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患（意見書は必要なし）

ヘルパンギーナ	<p>全身状態がよければ（解熱、咽頭痛消失など）登園可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…38 度～40 度の高熱、咽頭部の水疱 ・ 感染経路…飛沫感染
手足口病	<p>全身状態がよければ（解熱）登園可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…手のひら、足の裏、口の中に米粒のような発疹 ・ 感染経路…飛沫感染
伝染性紅斑 (りんご病)	<p>発疹のみで全身状態の良い者は登園可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主な症状…軽い風邪症状の後、発疹出現（顔面に紅斑性発疹） ・ 感染経路…飛沫、接触感染

●通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患

アタマジラミ	<p>駆除用のシャンプー、パウダーを使用し治療することが必要</p>
伝染性膿痂疹（とびひ）	<p>病巣が乾燥するまでガーゼ保護が必要（プール入水禁止） また、症状によっては 1～5 日程度、自宅療養が必要（医師の判断）</p>
水いぼ	<p>とくに必要な処置なし</p>

※出席停止期間はあくまでも目安です。必ず医師の指示を仰いでください。

なお意見書が必要でない疾患でも受診の際、自宅療養期間、登園可能時期を医師に必ず確認して下さい。